

ANEXA 4

BOALA MENINGOCOCICA

CHIMIOPROFILAXIE - ANTIBIOTICE, SCHEMA

- Rifampicina timp de 2 zile, in doza de 600 mg la 12 ore interval la **adult**, 10 mg/kg la **copii** si de 5 mg/kg la cei sub 1 luna.
- Asocierea rifampicina + minociclina da cele mai bune rezultate (sterilizare bacteriologica 100%):
- Ciprofloxacina, intr-o singura doza orala (750 mg) realizeaza sterilizarea purtatorilor **adulti** de meningococ in 92% din cazuri.

Nu se utilizeaza la copii datorita alterarilor la nivelul cartilajelor de crestere.

- Pentru serogrupul A se poate administra Ceftriaxona intramuscular intr-o singura doza de 250 mg la **adult** si 125 mg la **copii**, cu eficienta 97%.
- Spiramicina, pe cale orala, 5 zile, in următoarele doze: adulti: 3 mil. UI de 2 ori/zi; nou-nascuti si copii: 75.000 UI/kg de 2 ori/zi.

Se vor respecta precautiile si contraindicatiile antibioticelor folosite!

	Doza adulti	Doza copii	Cale de administrare	Durata
Rifampicina	600 mg/12 h	10 mg/kg/12 h	orala	2 zile
Spiramicina	1 mg/12 h	25 mg/kg/12 h	orala	5 zile
Ciprofloxacina	500 mg	-	orala	doza unica
Ceftriaxona	250 mg	-	im	doza unica